

Grossenhain (Altbefall) wurden 367 Nester auf einer Eichenkrone gefunden. Im Durchschnitt befinden sich 300 Raupchen im Nest, wovon etwa 14% an abgestorbenen Raupen in Abzug zu bringen sind. In Nestern, die im Marz aus Frauenhain eingeschickt wurden, waren 47% der Raupchen abgestorben (n = 1329). Zum mindesten fur das Jahr 1954 ist mit der Fortsetzung des Schadfraes zu rechnen.

Der **Buchenrotschwanz** (*Dasychira pudibunda* L.) erreicht 1954 in Thuringen in einer gleichfalls besonders heftigen Gradation ein drittes Frajahr. Der herdweise Fra von 1952 erweiterte sich 1953 zu Schadfachen bis zu 500 ha Ausdehnung, wobei auch die Herdgebiete von 1952 wieder kahlgefressen wurden. 1954 wird es bei ringformigem Fra bleiben, da nur am Rand des Kahlfragebietes noch 40 Kokons je qm liegen, die Anzahl sich aber schnell in weiterer Entfernung vom Frazentrum auf 1 bis 2 je qm verringert. Die Parasitierung der Raupen blieb 1952 und 1953 unbedeutend (1% und 2%), die Polyederanteile stiegen dagegen von 36%

auf 87% (n = 155 und 471); auerdem kamen Bakteriosen vor. Die Untersuchung von Raupen aus Frazentren und Randgebieten zeigte keine Unterschiede im Auftreten von Parasiten und Polyedern. Der Anteil toter Vorpuppen betrug in beiden Jahren 18% und 11%, die Parasitierung der Puppen 0% und 3%, der Befall durch Polyeder war trotz der Verpuppung noch mit 8% und 7% feststellbar, der Weibchenanteil stieg 1952 bis 1953 von 52% auf 60% (n = 370 und 872).

Ergebnisse: 1954 ist ein Massenflug der **Fichtengespinstblattwespe** und der **Kiefernbestands-Gespinstblattwespe** mit uberwiegenden Weibchenanteilen zu erwarten. Das Auftreten samtlicher anderen Kieferninsekten einschlielich des **Kiefernspanners** ist 1954 ohne wirtschaftliche Bedeutung; wegen der z. T. hohen Parasitierungsanteile gilt diese Feststellung auch fur weitere Jahre. Beim **Goldafter** ist 1954 zur Verpuppungszeit die Fortsetzung der biologischen Kontrollen notwendig. Der **Buchenrotschwanz** erreicht 1954 in Thuringen ein drittes und letztes Frajahr.

Besprechungen aus der Literatur

WILHELM, S. und PYFROM, H. T., **Soluble salt injury to Gardenia**, — *California agric.* 3, 5 u. 12, 1949.

Die Anzucht von Gardenien in den Gewachshusern der Umgebung von San Francisco ist stark durch hohen Salzgehalt des Bodens in Mitleidenschaft gezogen worden. Krankheitsverlauf sind abhangig von Salzgehalt und Art der Wasserzufuhr. Salzgehalt in der Wurzelzone bedingt Bilder, die denen bei Trockenheit und Nahstoffmangel entsprechen. Im Verlauf der Erkrankung kommt es zum Abfallen von Blutenknospen und Blattern. Gelegentlich kommt es zur Korkbildung am Rande der salzgeschadigten Gewebe. Die jungeren Wurzeln sind dunkel verfarbt. Bei schnellem Kollaps vertrocknen die Blatter, ohne ihre grune Farbe zu verlieren, bei langsamem Verlauf werden die Blatter gelb und fallen ab.

M. KLINKOWSKI

DAVISON, R. M., **Control of pre-harvest drop of Washington Navel oranges**, — *New Zealand Journ. sci. technol. sect A*, 34, 306—312, 1952

Verdunnte warige Losungen von 2,4-D, 2,4,5-T und MCPA (2-methyl 4-chlorphenoxyessigsaure) wurden auf ihre Wirkung auf den vorzeitigen Frucht-abfall von Orangen gepruft. Die Reduktion im

Fruchtabfall betrug bei 2,4-D 60—80%, ein gleiches gilt fur 2,4,5-T; wenig wirksam war MCPA. Eine einzige Anwendung von 2,4-D im Spatsommer, kurz vor oder unmittelbar nach Beginn des Fruchtabfalles, reduzierte den Verlust bis zu einer Dauer von 15 Wochen bis zur Ernte im August oder September. Die Wirkungsdauer war wesentlich geringer bei Mischungen mit Kupferpreparaten.

M. KLINKOWSKI

PONOMARENKO, A. W., **Die Bekampfung der Feldmaikafer bei der Verseuchung kleiner Flachen**, „Wissenschaftliche Erfolge und Erfahrungen in der Landwirtschaft“. Moskau 1953, S. 60—62.

Verfasser empfiehlt eine Methode fur die Engerlingsbekampfung, die in dreijahriger Forschungsarbeit von Prof. B. W. DOBROWOLSKIJ (Rostow) und seinen Mitarbeitern fur eine direkte Behandlung der einzelnen Herde entwickelt wurde. Ein Spaten wird unter einem Winkel von 35—40° in den Boden gestochen. In das durch Druck nach vorne entstandene Loch wird das Behandlungsmittel (1 Ltr. Wasser/50 g 12%iges Hexa) gegossen. Danach wird der Spaten herausgezogen und die Behandlungsstelle geebnet. Bei starkem Befall mu das Verfahren mechanisiert werden.

I. GIESECKE

Personalnachrichten

PROF. E. WERTH 85 JAHRE

Am 11. Marz dieses Jahres feierte der hochverdiente Forscher Prof. E. Werth in geistiger und korperlicher Frische und bei unermudlicher Arbeit seinen 85. Geburtstag. Trotz schwerer Schicksalsschlage in seiner Familie und vielen zeitbedingten Schwierigkeiten fur seine wissenschaftlichen Arbeiten hat seine auergewohnliche Schaffenskraft nicht nachgelassen. Die Ergebnisse seiner Forschungen in funf Erdteilen auf vielseitigen Gebieten der Biologie (Phytopathologie, Klimatologie, Geologie, Pflanzen- und Tiergeographie, Geschichte der Pflan-

zenbau- und Ackerbaukultur) wurden immer wieder neu kritisch bearbeitet, vervollstandigt und neue Zusammenhange festgestellt. Seine Lebensarbeit an Hand einer kurzen Beschreibung seines Lebenslaufes wurde bereits in dieser Zeitschrift (vgl. Jg. 2, 1948, S. 203—204) in groen Zugen geschildert. Einige hundert Veroffentlichungen auf den eben genannten Gebieten geben Zeugnis von der unermudlichen Arbeit des Forschers. Als Kronung und Synthese seiner vielseitigen Forschungen soll, wie wir horten, demnachst sein Manuskript uber „Grabstock, Hacke

und Pflug — Versuch einer Entwicklungsgeschichte des Landbaues“ als ein größeres Werk erscheinen. Wir wünschen, daß es ihm noch viele Jahre vergönnt bleiben möge, durch sein vielseitiges, tiefes Wissen und seine außergewöhnliche Schaffenskraft die Wissenschaft und Kultur aller Völker mit seinem Gedankengut weiter zu bereichern. M. KLEMM

Die Fabricius-Medaille, gestiftet von der Deutschen Entomologischen Gesellschaft zur Auszeichnung besonders wertvoller Leistungen in der Wissenschaft von den Insekten, wurde nach elfjähriger zeitbedingter Pause soeben verliehen an: Professor HERMANN WEBER, Tübingen, für seine Werke „Lehrbuch der Entomologie“ und „Grundriß der Insektenkunde“ als Grundlage für die wesentliche Förderung der Entomologie im Hochschulunterricht; Professor Dr. ERICH MARTINI, Hamburg, für seine Lebensarbeit auf dem Gebiet der Medizinischen Entomologie und insbesondere für sein Werk „Lehrbuch der Medizinischen Entomologie“; Professor Dr. WILLI HENNIG, Berlin, für sein grundlegendes Werk „Die Larvenformen der Dipteren“.

Durch tragischen Familienunfall ist der bekannte Fachmann auf dem Gebiete der Bismarckenbekämpfung in Deutschland, ADAM ROITH (Konstrukteur der seit Jahrzehnten weitverbreiteten sogenannten Roith-Fallen für Bismarckenfang), im Alter von 58 Jahren in Hilpoltstein (Mittelfranken) ums Leben gekommen.

(DPA Kurier vom 21. 12. 1953.)

Berichtigung

In dem Aufsatz von KÄMPFE, L., „Ein einfaches Laborprüfverfahren“ in Heft 1, 1954, S. 12 des Nachrichtenblattes müssen die Unterschriften zu den Abbildungen wie folgt lauten:

Abb. 4 Durch ... Die Vergrößerung ist etwa 400fach

Abb. 5 Abgetötete ... Die Vergrößerung ist etwa 250fach

Abb. 6 Schwer ... Die Vergrößerung ist etwa 660fach

Herausgeber: Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin. — Verlag Deutscher Bauernverlag, Berlin C 2, Am Zeughaus 1/2; Fernsprecher: 20 04 41; Postscheckkonto: 439 20. — Schriftleitung: Prof. Dr. A. Hey, Kleinmachnow, Post Stahnsdorf bei Berlin, Stahnsdorfer Damm 81. — Erscheint monatlich einmal. — Bezugspreis: Einzelheft 2,— DM, Vierteljahresabonnement 6,— DM einschließlich Zustellgebühr. — In Postzeitungsliste eingetragen. — Bestellungen über die Postämter, den Buchhandel oder beim Verlag. — Anzeigenverwaltung: Deutscher Bauernverlag, Berlin C 2, Am Zeughaus 1/2; Fernsprecher: 20 04 41; Postscheckkonto: 443 44. — Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 1102 des Amtes für Literatur und Verlagswesen der DDR. — Druck: (13) Berliner Druckerei, Berlin C 2, Dresdener Straße 43. Nachdrucke, Vervielfältigungen, Verbreitungen und Übersetzungen in fremde Sprachen des Inhalts dieser Zeitschrift — auch auszugsweise mit Quellenangabe — bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Verlages.



Ohne Gnade
DUPLEXOL
räumt auf!

Duplexol, das sicher wirkende Emulsions-spritzmittel zur Bekämpfung von Fliegen, Wanzen, Schaben und sonstigen lästigen Insekten in Innenräumen.

Wirkstoff: Hexa-Gamma-DDT. Sofort- u. Dauerwirkung
Erhältlich durch:

Staatliche Kreiskontore, BHG · Fachhandel
Druckschriften fordern!



VEB ELEKTROCHEMISCHES KOMBINAT BITTERFELD

Schorffreies Obst
durch
Fuklasiin
F.

das kupferfreie
Spritzmittel zur Vor- und
Nachblütespritzung

Amlich geprüft und anerkannt

 **VEB SCHERING ADLERSHOF**
BERLIN · ADLERSHOF